



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău , Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 22 / 14 .04 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Venturia i. (rapan), **Podospaera L.** (fainare), etc + **insecte defoliatoare, omizi miniere, oua de aphidae, psylidae,** etc. – MAR .

FUNGICIDE

MACCANI

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	2,5 kg/ha	35 zile	-
-----	------	-------------------	-----------	---------	---

ORIOUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	0,05 % (0,75 L/ha in 1500 L apa)	14 zile	-
-----	------	-------------------	----------------------------------	---------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
-----	-----------	-------------------------	--------------------------------	--------	---

Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-
-----	-----------	-------------------	---	--------	---

FASTAC 10 EC

Mar	Dăunători	Omida paroasa a dudului		0,02%	--
-----	-----------	-------------------------	--	-------	----

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul circular al marului, viespile, molia pielitei fructelor		0,015%	--
-----	-----------	--	--	--------	----

Mar	Dăunători	Omida miniera mica, molia miniera sinuoasa, molia miniera marmorata		0,008%	--
-----	-----------	---	--	--------	----

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

livezi de m`ar	Dăunători	p` aduchele l`anos	0,05% (0,750 l/ha ` in 1500 l ap` a)		--
----------------	-----------	--------------------	--------------------------------------	--	----

Tratamentul se va aplica in perioada cand 10-15 % din petale s-au scuturat

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuie (până la data **de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 23 / 14.04.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

-**DAUNATORI RAPITA**- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorrhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

- Se aplica la depistare cu repetare la 7 – 8 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frășinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 24 / 14 .04.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE** in spatii protejate .

DAUNATORI

APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1,8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	p`aducele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	-----------------	------------------	--

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FLIPPER

tomate (c~amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	--	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

BOLI**CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	---	--	--------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii
--------	------	--	-------------------	--

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile
Tomate (rasad)	Boli	caderea plantutelor, mana de sol, putregaiul radacinilor	0,15 % (4-5 l sol./mp)	-

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU