

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ  
Tg.Mureș, Jud.Mureș, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245  
[ofmures@anf.ro](mailto:ofmures@anf.ro)

**BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 18/ 11 .05. 2022**

Oficiul Fitosanitar Mureș recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în culturile de **raپیٹă** cu produse pentru protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de dăunare: **gândacul lucios** (*Meligethes aeneus*), **gărgărița semințelor** (*Ceuthorrhynchus assimilis*), **țântărașul galicol al silicvelor** (*Dasyneura brassicae*) și alți dăunători.



Mod de atac: **Gândacul lucios** (*Meligethes aeneus*) – Adulții care apar în primăvară, în primele stadii se hrănesc cu frunzele de la baza tulpinii iar apoi cu florile și tecile plantei. Larvele distrug frunzele, lasând doar nervurile dar atacă și organele florale.

**Gărgărița semințelor** (*Ceuthorrhynchus assimilis*) – Adulții rod cavități în tulpini, pedunculi și în butonii floralii iar larvele rod semințele în formare.

**Țântărașul galicol al silicvelor** (*Dasyneura brassicae*) – Larvele acestui dăunător se hrănesc cu peretele interior al silicvelor, provocând simptome tipice de bășicare a acestora. Silicvele atacate se îngălbenesc și se sparg prematur, ducând la pierderea totală a semințelor.

Tratamentele se aplică până la depistarea dăunătorilor în cultură (PED la *Meligethes aeneus* este când se observă mai mult de 1 gândac lucios pe plantă).

Pentru tratamente recomandăm **MAVRIK 2F (Evure)** – 0,2 litri/ha la Păduchele cenușiu, gărgărița tulpinilor, viespea rapiței, gândacul lucios al rapiței.

În caz de atac cu agenți patogeni aplicați în soluția de stropit și un fungicid: **AMISTAR – (MIRADOR 250 SC)** -0,75 – 1,0 l/ha, în funcție de gradul de infecție sau **FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250EW)** – 1,00 l/ha.

**Alte recomandări!**

Se vor avertiza apicultorii din zona în care urmează a fi tratate suprafețele.

Se vor utiliza numai ppp. omologate înregistrate în baza de date PEST-EXPERT - <https://aloe.anfd.ro/> utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator „guest”.

Pentru tratament se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate cu efect similar.

Citiți cu atenție prospectul / instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare.

Verificați recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de ppp.

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora. – program



SCAPA, [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Respectați normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp);

Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

SEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogăcian Marian

Intocmit  
Ing. Bologa Vasile

